




### Aktuální epidemiologická situace ve výskytu dávivého kašle

Od začátku roku 2023 zaznamenáváme zvyšující se trend výskytu dávivého kašle v kraji, který dle aktuálních dat pokračuje i v roce letošním. Problematicke dávivého kašle včetně příznaků, inkubační doby, přenosu a léčbě jsme se věnovali v tiskové zprávě ze dne 3. 3. 2023 [ZDE](#).

V roce 2023 jsme v Olomouckém kraji evidovali celkem 139 případů dávivého kašle (65 pertuse a 74 parapertuse), přičemž nejvyšší výskyt byl v okrese Olomouc (102), následoval Prostějov (18), Přerov (17) a Šumperk (2). V lednu 2024 jsme v kraji evidovali 15 případů onemocnění (10 případů pertuse a 5 parapertuse). Dle okresů bylo nejvíce případů hlášeno v Olomouci (11), následoval Prostějov (2), Přerov (1) a Šumperk (1). Za druhý měsíc letošního roku jsme ke dni 18. 2. 2024 zaznamenali 11 případů onemocnění (10 pertuse a 1 parapertuse), z nichž 7 bylo v okrese Olomouc, 3 v Šumperku a 1 v Prostějově. Onemocnění se objevuje napříč populací a týká se všech věkových skupin.

Graf č. 1: Evidované počty případů pertuse a parapertuse v Olomouckém kraji v letech 2019-2023



Úspěšným nástrojem prevence proti pertusi je očkování, které je součástí povinného očkování dětí v tzv. hexavakcíně. Ačkoliv se onemocnění v populaci stále vyskytuje, proočkovanost postupně klesá. Přesto právě vysoká proočkovanost přispívá ke kolektivní imunitě a nepřímo tím chrání rizikovou populaci. I očkovaní jedinci se mohou nakazit, zabrání se však závažnějšímu průběhu nemoci, případně hospitalizaci. Imunita po očkování se s věkem pozvolně snižuje (ani po prodělání onemocnění není imunita celoživotní). Přetrvání imunity se uvádí v rozmezí 3 až 12 let. Státní zdravotní ústav (SZÚ) doporučuje přeočkování dospělých alespoň 1x za život kombinovanou vakcínou (záškrt-tetanus-černý kašel), a to především u těch, kteří plánují založení rodiny. Žena očkovaná před těhotenstvím chrání své nově narozené dítě

v prvních měsících svými protilátkami. Očkováním chráníte nejen sebe, ale především své blízké.

Každý, kdo se necítí dobře, by měl omezit své kontakty a zůstat doma, a tím zabránit šíření nemoci. V případě obtíží pak kontaktovat svého praktického lékaře. Důležité také je, aby do dětského kolektivu nebyly zařazovány děti nemocné a nedolčené.

Podrobné informace k dávivému kašli, včetně možnosti poslechnout si, jak černý kašel zní, zveřejnil na svých stránkách SZÚ [ZDE](#).

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D., tisková mluvčí, telefon 585 719 244, e-mail: [media@khsolc.cz](mailto:media@khsolc.cz)