



## Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky

- řídit se při práci s dezinfekčními přípravky návodem k použití uvedeným na etiketě výrobku
- nikdy nemíchat různé dezinfekční přípravky mezi sebou
- používat ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv
- po skončení dezinfekce opláchnout řádně všechny předměty zdravotně zajištěnou pitnou vodou  
(dále jen „pitná voda“)



### 1. První pomoc pro žíraviny – způsobující poleptání kůže (C)

- Při nadýchání žíraviny a preparátů s obsahem chloru

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost **dopřít postiženého na čerstvý vzduch, zabránit chůzi postiženého!** Podle situace lze doporučit u postiženého výplach ústní dutiny, případně nosu pitnou vodou, převléknutí do čistého oděvu v případě, že je oděv zasažen žíravinou, zajistit postiženého proti prochladnutí; podle situace volat zdravotnickou záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření.

- Při zasažení očí

**Ihned vypláchnout oči proudem tekoucí pitné vody** (oční víčka rozevřít i násilně); pokud má postižený aplikované kontaktní čočky, zajistit jejich okamžité vyjmutí. V žádném případě neprovádět neutralizaci! Výplach oka provádět alespoň 15 minut od vnitřního koutku k zevnímu; podle situace zajistit lékařské ošetření.

- Při styku s kůží, polítky

**Ihned svléct potřísněné šatstvo, zasažená místa oplachovat proudem, pokud možno vlažné pitné vody po dobu 10-15 minut;** poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem, na kůži nepoužívat masti ani jiná léčiva, zajistit postiženého proti prochladnutí; podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření.

- Při požití

**NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ** – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu. **Nepodávat nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče.** Pokud je postižený při vědomí, vypláchnout dutinu ústní vodou a podat k vypití 2-3 dl chladné pitné vody. K pití postiženého nenutit, zejména má-li bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechat postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou, nepodávat žádné jídlo a zajistit co nejdříve lékařské ošetření.

## 2. Přípravky dráždivé se symbolem



- Při nadýchání

Okamžitě **přerušit expozici dráždivému přípravku, dopravit postiženého na čerstvý vzduch**, zajistit postiženého proti prochlazení; zajistit lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

- Při styku s kůží, políží

**Odložit potřísněný oděv, omýt postižené místo velkým množstvím, pokud možno vlažné pitné vody.** Pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon; zajistit lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

- Při zasažení očí

**Ihned vypláchnout oči proudem tekoucí pitné vody** (víčka otevřít i násilím); pokud má postižený aplikované kontaktní čočky, zajistit jejich okamžité vyjmutí. Výplach oka provádět nejméně 10 minut; zajistit lékařské vyšetření.

- Při požití

**NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ**, pokud možno podat aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety v 1-2 dl pitné vody), kontaktovat Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření (sdělit údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku, u osoby, která má zdravotní obtíže), zajistit lékařské ošetření. Nepodávat nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí nebo má křeče. **Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402.**

Olomouc, září 2024